


Informativa per i pazienti che devono essere sottoposti a EGDS

1. Per eseguire EGDS bisogna essere forniti di **impegnativa del proprio medico curante**. Poiché nel corso dell'esame potrebbe essere necessario eseguire prelievo bioptico è opportuno che l'impegnativa sia redatta per **"EGDS + eventuale biopsia"**
2. Per verificare nel corso della EGDS l'esistenza o meno di infezione da HP (Helicobacter Pilory) bisogna portare **due impegnative**:
 - una per EGDS + eventuale biopsia;
 - una per HP ureasi su materiale bioptico;

La verifica della presenza di infezione dell'HP si esegue praticando un prelievo bioptico che viene successivamente immerso in un reagente di colore giallo che vira al colore viola a contatto con l'ureasi sviluppata dall'HP se presente nel prelievo bioptico.
3. Se l'impegnativa non è redatta correttamente e la procedura richiesta non corrisponde a quella eseguita, il referto verrà consegnato al paziente solo al momento della presentazione dell'impegnativa debitamente corretta.
4. Per eseguire l'EGDS, il giorno dell'esame bisogna essere digiuni dalla sera prima o almeno da 8 ore.
5. Il giorno dell'esame è opportuno evitare l'assunzione di farmaci che ostacolano una corretta visione (sucralfato, antiacidi Maalox – Gastrogel – Riopan – Gaviscon, etc.)
6. I cosiddetti "farmaci salvavita" possono essere assunti anche il giorno dell'esame.
7. Se si assumono farmaci antiaggreganti (Cardioaspirina, Cardirene, Ascriptin, Ticlid, etc) è opportuno sospenderne l'assunzione 4 giorni prima dell'esame.
8. Se si è affetti da diabete in trattamento con insulina, il giorno dell'esame è opportuno informare gli addetti all'accettazione che provvederanno ad avvisare il medico endoscopista.
9. Se si è affetti da altre patologie quali: insufficienza renale in trattamento dialitico, grave cardiopatia, glaucoma, insufficienza respiratoria, allergie a farmaci, informare il medico endoscopista e portare con sé i nomi dei farmaci che si assumono abitualmente.

10. Se nel corso della EGDS, si prevede di eseguire la ricerca di infezione da HP è opportuno sospendere l'assunzione di farmaci tipo PPI 4/5 giorni prima dell'esame.
11. E' opportuno portare in visione eventuali referti di EGDS eseguita precedentemente.
12. Qualora il medico endoscopista ne rilevi l'opportunità, l'EGDS può essere eseguita con sedazione. **È opportuno pertanto farsi accompagnare. Dopo l'esame eseguito in sedazione infatti non si può guidare o eseguire attività che richiedano particolare attenzione per 24 ore.**
13. Prima dell'esame il paziente in grado di intendere e di volere, o un genitore o un tutore, se il paziente è minore o non in grado di intendere e volere, dovrà firmare un modulo di consenso all'esame ed alla eventuale sedazione.
14. Il referto verrà redatto dal medico endoscopista subito dopo l'esame e verrà consegnato al paziente prima della dimissione.
15. La Casa di Cura non esegue esami istologici. Pertanto se nel corso dell'esame endoscopico verrà eseguito prelievo biptico, questo assieme al modulo di richiesta di esame istologico, verrà consegnato al paziente che dovrà provvedere a portarlo presso un centro di Anatomia patologica.



ATTENZIONE:

È necessario parlare con il medico endoscopista alcuni giorni prima di eseguire l'esame e prima di eseguire la preparazione nelle seguenti situazioni:

- Se si assumono farmaci antiaggreganti tipo Clopidrogel (Plavix);
- Se si assumono farmaci anticoagulanti tipo Sintrom, Dicumadin;
- Se si è affetti da diabete in trattamento con insulina;
- Se si è affetti da patologie quali:
 - insufficienza renale grave e/o in trattamento dialitico;
 - grave cardiopatia;
 - insufficienza respiratoria.

Il personale addetto all'accettazione provvederà a fissare appuntamento per consulto gratuito con il medico.