

Informativa per i pazienti che devono essere sottoposti a colonscopia e ileoscopia retrograda

Per eseguire l'esame bisogna essere forniti di impegnativa del proprio medico curante.

L'esame completo prevede l'esplorazione del retto, del colon e del tratto terminale dell'ultima ansa ileale spesso sede di patologie; inoltre nel corso dell'esame potrebbe essere necessario eseguire prelievo biptico.

Per eseguire esame completo è opportuno che l'impegnativa sia redatta per:

“colonscopia con ileoscopia retrograda + eventuale biopsia”.

Se l'impegnativa non è redatta correttamente e la procedura richiesta non corrisponde a quella eseguita il referto verrà consegnato solo al momento della presentazione dell'impegnativa debitamente corretta.

Il giorno dell'esame bisogna essere digiuni e aver eseguito preparazione intestinale come da schema.

I cosiddetti “farmaci salvavita” possono essere assunti anche il giorno dell'esame.

Se si assumono farmaci antiaggreganti (cardioaspirina, Cardirene, Ascriptin, Ticklid, ecc.) è opportuno sospenderne l'assunzione almeno 4 giorni prima dell'esame.


È opportuno portare in visione esami di colonscopia eseguiti in precedenza.

Qualora il medico ne ravvisi l'opportunità, la colonscopia con ileoscopia può essere eseguita con sedazione. **È opportuno pertanto farsi accompagnare, dopo l'esame eseguito in sedazione infatti non si può guidare o eseguire attività che richiedono particolare attenzione per 24 ore.**

Prima dell'esame il paziente in grado di intendere e di volere, o un genitore o un tutore, se il paziente è minore o non in grado di intendere di volere, dovrà firmare un modulo di consenso all'esame.

Il referto verrà redatto dal medico endoscopista subito dopo l'esame e verrà consegnato al paziente prima della dimissione.

La Casa di Cura non esegue esami istologici. Pertanto se nel corso dell'esame endoscopico verrà eseguito prelievo biptico, questo verrà consegnato al paziente assieme al modulo di richiesta di esame istologico che dovrà provvedere a portarlo presso un Centro di Anatomia Patologica.



ATTENZIONE:

È necessario parlare con il medico endoscopista alcuni giorni (almeno 5 giorni) prima di eseguire l'esame e prima di eseguire la preparazione nelle seguenti situazioni:

- se si assumono farmaci antiaggreganti tipo Clopidrogel (Plavix);
- se si assumono farmaci anticoagulanti tipo Sintrom, Dicumadin;
- se si è affetti da diabete in trattamento con insulina;
- se si è affetti da patologie quali:
 - insufficienza renale grave e/o in trattamento dialitico;
 - grave cardiopatia;
 - insufficienza respiratoria.

Il personale addetto all'accettazione provvederà a fissare appuntamento per consulto gratuito con il medico.